〇みぞしだトみぞしだもどき

みぞしだ (Dryopteris africana CHRIST.)

ハ本邦ニ可ナリ普通ノ羊齒デ囊堆

(Sori)

ガ 脈

沿フテ線形ヲ

ナ

ِ پ

胞

緒

方

正

資



違デ ヲ認メタ ぞしだもどきノ胞子嚢ニハ兒玉學士 頃日此兩羊齒ノ生本ヲ觀察シテ居ル際み 物圖編』 子囊ノ環帯ガ黑色ナ しだノ胞子囊ガ刺毛ノ ガ嚢堆ハ 圓形デアルノデ 區別 ガデキ タ新種デ外形ハみぞしだニ酷似シテ居 士兒玉親輔氏ガ大正三年一月ニ (Dryopteris izuenseis Kodama.) シク黑色ニ見エ (本誌第一 ョウナ刺毛 ヲ取 第二編第八十八圖版デ發表 一卷第八號第一九三頁參照 恐クコ リ違 思 ハ決シテナク却テ iv コノみぞしだもどき 原著者 , 所有者ご 爲ニ デ 此 囊堆全體 3 リ生ジ ガ ク理 予 み ガ著 圖

みぞしだトみぞしだもどき

デ見付カラヌトモ限ラナイ其場合採集比較スル人ガ前述ノ様ナ混亂シテ居 ナイ爲メニ一言スル次第デアル豈他意アランヤデアル コトヲ尊重スルトセバ同一ノモノガ更ニ ラ 如 ク列記シテ其異同ヲ辯ジテ見 タ ノイト 新種ダナドト云ハレ 思フ元來コ ノンギ 歯 ルコトニナラナイトモ ノ如 n 產 地 ノ極限 ル事情ヲ知ラズニ兒玉氏ノ記述シ サレ 限ラナイカラ後人ヲ誤ラ . テ居 jν Æ 他日 何 處 セ タ 力

みぞしだもどき ぞしだ

> 胞 子

脈上ノ毛茸ハ釣狀ヲナサズ

みぞしだもどき

みぞしだ

リヲ生ゼル脈ハ往々分枝ス ハ線形ヲナス

釣狀ヲナス 分枝セズ

圓形ヲナス

胞子囊ニハ刺毛ヲ有ス

ラレタル羊齒ハ前文緒方君ノ指摘セラレタ通り みぞしだもどき ト みぞしだトガ 【牧野日ク】 兒玉理學士カ『新撰植物圖編』第二編第一集第八十八圖版デ發表セ 緒ニナッテ居り其原文嚢堆 (sori) ノ記載文モ "sporangio saepe setoso"ト 刺毛ヲ有セズ

ナリ原圖ニハ子蘂 即チ芽胞蘂ニ刺毛ガアル、是ニ由テ私ハ此 みぞしだもどき ノ

學名ヲ次ノ如ク修正シテ見タ Dryopteris pseudo-africana Makino et Ogata = Dryopteris izuensis Kodama in Marsum. Ic. 7, tab. 88 (1914), partim.

Pl. Koisikav. II. 1,

Dryopteris africana С. Снк Jap. Mizoshida-modoki

= Dryopteris izuensis Kodama, l. c. partim

Nom. Jap. Mizoshida